

Para personas con prurito colestásico en el síndrome de Alagille...

# BÚSQUELO. ANALÍCELO. TRÁTELO.



El prurito colestásico en el síndrome de Alagille puede ser diferente para cada persona. Los signos y síntomas relacionados con el prurito colestásico pueden variar entre el día y la noche, cambiar con las estaciones, presentarse de forma diferente entre los pacientes o incluso cambiar con la edad.

## ¿HA DETECTADO ALGUNA DE ESTAS SEÑALES DE PRURITO COLESTÁSICO?



### BEBÉS



Problemas del sueño



Irritabilidad



Se retuercen



Se retuercen



Introducirse los dedos en los oídos



### NIÑOS



Problemas del sueño



Irritabilidad



Daño en la piel



Frotar los pies



Rascado activo



Inquietud



Incapacidad para concentrarse



### ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES



Problemas del sueño



Irritabilidad



Daño en la piel



Frotar los pies



Normalizar la picazón



Molestias físicas



Incapacidad para concentrarse

Para las personas con síndrome de Alagille, hay necesidad de opciones de tratamiento que ayuden a aliviar el prurito colestásico.

# SUPERE EL PRURITO COLESTÁSICO

Ha identificado el prurito colestásico y ha analizado el impacto que puede tener en la vida cotidiana. **Ahora es el momento de encontrar una opción de tratamiento eficaz.**

**LIVMARLI** es un medicamento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) para el prurito colestásico en personas con síndrome de Alagille de 3 meses de edad o más.

Visite [LIVMARLI.com](https://LIVMARLI.com) para averiguar si es adecuado para usted y oír a otras personas que toman LIVMARLI y a sus familias.



## INDICACIÓN

LIVMARLI es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar el prurito colestásico (picazón) en pacientes con síndrome de Alagille de 3 meses de edad o más.

Se desconoce si LIVMARLI es seguro y eficaz en niños con síndrome de Alagille menores de 3 meses de edad. Se desconoce si LIVMARLI es seguro y eficaz en adultos de 65 años de edad o más.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LIVMARLI?

LIVMARLI puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

- **Daño hepático.** Los cambios en ciertas pruebas hepáticas son frecuentes en los pacientes, pero pueden empeorar durante el tratamiento con LIVMARLI. Estos cambios pueden ser un signo de daño hepático y pueden ser graves. Su proveedor de atención médica debe realizarle análisis de sangre y exámenes físicos antes de comenzar el tratamiento y durante el tratamiento para comprobar su función hepática. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si presenta algún signo o síntoma de problemas hepáticos, incluyendo:
  - náuseas o vómitos
  - coloración amarillenta de la piel o la parte blanca del ojo
  - orina oscura o marrón
  - dolor en el lado derecho del estómago (abdomen)
  - sensación de plenitud, hinchazón o acumulación de líquido en la zona del estómago (ascitis)
  - pérdida del apetito
  - sangrado o formación de hematomas con mayor facilidad de lo habitual, incluidos vómitos con sangre
- **Problemas estomacales e intestinales (gastrointestinales).** LIVMARLI puede causar problemas estomacales e intestinales, como diarrea y dolor de estómago durante el tratamiento. La diarrea también puede causar la pérdida de demasiada cantidad de líquido corporal (deshidratación grave). Su proveedor de atención médica puede aconsejarle que controle la aparición o el empeoramiento de problemas estomacales, incluidos dolor de estómago, diarrea, sangre en las heces o vómitos.

Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si presenta algún signo o síntoma nuevo de problemas estomacales e intestinales, o un empeoramiento de tales signos o síntomas, incluidos:

- diarrea
- deposiciones más frecuentes de lo habitual
- heces negras, alquitranadas, pegajosas o con sangre o mucosidad
- dolor o sensibilidad intensos en la zona del estómago
- vómitos
- micción menos frecuente de lo habitual
- mareos
- dolor de cabeza

- Una afección llamada **deficiencia de vitaminas liposolubles (VLS) causada por niveles bajos de ciertas vitaminas (vitaminas A, D, E y K), que se almacenan en la grasa corporal.** La deficiencia de VLS es frecuente en los pacientes con síndrome de Alagille pero puede empeorar durante el tratamiento. Su proveedor de atención médica debe realizarle análisis de sangre antes de empezar el tratamiento y durante este, y puede controlar fracturas óseas y sangrado, que son efectos secundarios frecuentes

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, ya que LIVMARLI puede interactuar con otros medicamentos. Si toma un medicamento que reduce el colesterol mediante la unión a ácidos biliares, como la colestiramina, el colesvelam o el colestipol, tómelo al menos 4 horas antes o 4 horas después de tomar LIVMARLI.

Su proveedor de atención médica puede cambiarle la dosis o interrumpir de forma temporal o permanente el tratamiento si tiene ciertos efectos secundarios.

LIVMARLI se toma por vía oral, 1 vez al día, 30 minutos antes de una comida por la mañana. Asegúrese de usar el dosificador oral proporcionado para medir con exactitud la dosis del medicamento.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LIVMARLI. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico. Llame a su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA, llamando al 1-800-FDA-1088.

Consulte la [Información para el paciente completa](#).